Les agriculteurs se mobilisent pour préserver nos ressources en eau…

Je protège, je partage

CONTRAT CAPTAGE

Le captage de Mont Saint-André

Sur la commune de Ramillies, c'est la Société wallonne des eaux (SWDE) qui exploite l'eau.

Le site de captage est composé de deux prises d'eau : un réseau de drains et un puits.



23 agriculteurs concernés
260 ha de zone de Contrat captage
78% de surfaces cultivées
10% de surfaces enherbées

Ici, à Ramillies, un Contrat captage est mis en place

Le Contrat captage a pour objectif de **préserver la qualité de l'eau** d'une zone de captage ou de l'améliorer. Il scelle l'engagement des agriculteurs et des partenaires du contrat autour du plan d'actions concertées.

QUELQUES ACTIONS MISES EN PLACE…

SURVEILLER LES POMMES DE TERRE DE PRÈS

La pomme de terre n'est pas une bonne élève en matière d'absorption de l'azote. Malgré ses besoins élevés, cette culture peut laisser des quantités importantes d'azote dans le sol après la récolte. Plusieurs raisons expliquent cela : un cycle de développement court, une faible profondeur d'enracinement, une faible densité de racines et une période de prélèvement de l'azote courte.

Un accompagnement spécifique est proposé aux agriculteurs cultivant la pomme de terre afin d'ajuster au mieux la fertilisation aux besoins de la plante. En appliquant la dose la plus juste d'engrais au bon moment, on évite qu'un surplus se retrouve dans le sol et soit entrainé vers les nappes phréatiques.

DES CULTURES INTERMÉDIAIRES POUR PIÉGER LE NITRATE

Certaines cultures laissent beaucoup d'azote dans le sol après leur récolte en été. C'est notamment le cas après une culture de légumes : petits pois, haricots, fèves… Si le sol est laissé nu avant la culture suivante, l'azote risque d'être emporté par l'eau en direction de la nappe phréatique. Le froment d'hiver, semé à l'automne, n'aura ni le temps ni l'occasion de puiser ces résidus pour sa croissance. Pour éviter ce phénomène de lessivage, des cultures intermédiaires de courte durée peuvent être mises en place. De cette manière, l'azote est puisé pour le développement de l'interculture et restitué au sol lors de sa destruction. Il sera alors disponible pour le froment à suivre.

Deux sortes de plantes peuvent rapidement se développer entre les deux cultures principales.





LE SAVAIS-TU?

40 000 ha

En moyenne, la pomme de terre occupe environ 40 000 ha en Wallonie. Cela représente **plus de 56 000 terrains de football**.

La **phacélie** est une plante originaire du Mexique et de la Californie (USA). Elle a été introduite en Europe au début du 19ème siècle.

La **moutarde** provient d'Afrique du Nord, d'Europe et d'Asie. Malgré ses petites fleurs jaunes, on parle de moutarde blanche.

PARTENAIRES DU CONTRAT CAPTAGE

Une initiative de la

SPGE Société Publique de Gestion de l'Eau

En partenariat avec

Wallonie environnement SPW

La société wallonne des eaux

PROTECT'eau

LIÈGE université Gembloux Agro-Bio Tech

UCLouvain

NAT AGRI WAL