



mise à jour : 15/03/2023

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha)
avec précédent CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate)**

Régions	Apport d'engrais de ferme en été	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	Min		Max	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	Aucun	23	49	116	34	5	7	114	176
	Fumier, compost	40	60	37	31	4	5	90	117
	Fientes, lisier	29	41	12	10	11	14	70	97
Famenne - Ardenne - Jurassique	Aucun	22	42	11	6	8	12	48	80
	Fumier, compost	61*	107*	1*	1*	61	107	61	107
Herbagère liégeoise	Aucun	49	87	22	10	8	47	110	164
	Fumier, compost	39	67*	5	3*	25	56	62	81
	Fientes, lisier	41	68	6	6	20	38	61	139
Limoneuse humide	Aucun	35	45	5	5	10	12	48	62
	Fumier, compost	22	34	11	10	12	19	41	84
	Fientes, lisier	43*	57*	4*	4*	20	31	68	90
Limoneuse sèche	Aucun	36	57	366	151	3	5	114	154
	Fumier, compost	42	58	174	153	6	7	125	200
	Fientes, lisier	42	71	54	39	7	9	133	211
Toutes les régions agricoles	Aucun	33	57	521	207	3	5	114	176
	Fumier, compost	41	58	228	198	4	5	125	200
	Fientes, lisier	40	65	76	59	7	9	133	211
Moyenne générale		36	58	825	464	3	5	133	211

* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

** se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **pommes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)