



mise à jour : 15/03/2023

Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha) avec précédent sol nu

Régions	Précédent	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	Min		Max	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	betterave	53	149	2*	1*	23	149	82	149
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	22	38	24	17	2	4	51	104
Famenne - Ardenne - Jurassique	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	18	21	8	7	5	7	32	35
Herbagère liégeoise	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	43	94	26	1*	12	94	78	94
Limoneuse humide	betterave	48	68	2*	2*	27	42	68	93
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	30	51	10	10	15	24	44	70
Limoneuse sèche	betterave	35	35	49	9	7	8	93	69
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	38	69	181	62	2	18	135	141
Toutes les régions agricoles	betterave	36	50	54	12	7	8	93	149
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	36	59	249	97	2	4	135	141
Moyenne générale		36	58	303	109	2	4	135	149

* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

** se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **pommes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)