



mise à jour : 12/04/2023

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO<sub>3</sub>/ha)  
avec précédent CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate)**

Régions	Apport d'engrais de ferme en été	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	Min		Max	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	Aucun	23	50	140	36	5	7	114	176
	Fumier, compost	36	60	60	34	4	5	90	117
	Fientes, lisier	28	41	15	12	11	14	70	97
Famenne - Ardenne - Jurassique	Aucun	19	30	38	23	7	10	48	80
	Fumier, compost	39	77*	13	2*	11	46	71	107
	Fientes, lisier	30	46	8	6	10	27	50	68
Herbagère liégeoise	Aucun	49	87	22	10	8	47	110	164
	Fumier, compost	39	67*	5	3*	25	56	62	81
	Fientes, lisier	41	68	6	6	20	38	61	139
Limoneuse humide	Aucun	35	45	5	5	10	12	48	62
	Fumier, compost	22	34	11	10	12	19	41	84
	Fientes, lisier	43*	57*	4*	4*	20	31	68	90
Limoneuse sèche	Aucun	36	56	417	165	3	5	114	154
	Fumier, compost	42	59	195	159	6	7	132	200
	Fientes, lisier	42	68	64	44	7	9	133	211
Toutes les régions agricoles	Aucun	32	54	623	240	3	5	114	176
	Fumier, compost	40	58	284	208	4	5	132	200
	Fientes, lisier	39	61	97	72	7	9	133	211
<b>Moyenne générale</b>		<b>35</b>	<b>57</b>	<b>1004</b>	<b>520</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>133</b>	<b>211</b>

\* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

\*\* se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **pommes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)