



mise à jour : 28/03/2024

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO<sub>3</sub>/ha)  
avec précédent CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate)**

Régions	Apport d'engrais de ferme en été	Reliquats min & max							
		Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Min		Max	
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	Aucun	18	29	125	50	3	9	86	72
	Fumier, compost	28	39	28	27	11	15	59	74
	Fientes, lisier	20*	27*	1*	1*	20	27	20	27
Famenne - Ardenne - Jurassique	Aucun	19	25	15	12	7	11	58	45
Herbagère liégeoise	Aucun	35	50	13	9	10	27	63	85
	Fumier, compost	33	48	12	12	16	22	51	73
	Fientes, lisier	46	68	8	7	26	40	60	87
Limoneuse humide	Aucun	28	38	7	7	6	9	47	61
	Fumier, compost	29*	37*	1*	1*	29	37	29	37
Limoneuse sèche	Aucun	29	41	397	153	3	4	80	94
	Fumier, compost	35	49	194	178	10	14	75	92
	Fientes, lisier	36	51	37	31	17	21	66	89
Toutes les régions agricoles	Aucun	26	38	557	231	3	4	86	94
	Fumier, compost	34	47	235	218	10	14	75	92
	Fientes, lisier	38	53	46	39	17	21	66	89
<b>Moyenne générale</b>		<b>29</b>	<b>43</b>	<b>838</b>	<b>488</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>86</b>	<b>94</b>

\* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

\*\* se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **pommes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)