



mise à jour : 10/04/2024

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha)
avec précédent CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate)**

Régions	Apport d'engrais de ferme en été	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	Min		Max	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	Aucun	18	28	135	55	3	9	86	72
	Fumier, compost	27	39	33	27	11	15	59	74
	Fientes, lisier	20*	27*	1*	1*	20	27	20	27
Famenne - Ardenne - Jurassique	Aucun	23	25	35	12	5	11	78	45
	Fumier, compost	32	0	14	0*	11	0	83	0
	Fientes, lisier	11*	0	2*	0*	11	0	11	0
Herbagère liégeoise	Aucun	35	50	13	9	10	27	63	85
	Fumier, compost	33	48	12	12	16	22	51	73
	Fientes, lisier	46	68	8	7	26	40	60	87
Limoneuse humide	Aucun	28	38	7	7	6	9	47	61
	Fumier, compost	29*	37*	1*	1*	29	37	29	37
Limoneuse sèche	Aucun	29	41	411	154	3	4	80	94
	Fumier, compost	35	49	195	178	10	14	75	92
	Fientes, lisier	36	51	37	31	17	21	66	89
Toutes les régions agricoles	Aucun	26	37	601	237	3	4	86	94
	Fumier, compost	34	47	255	218	10	14	83	92
	Fientes, lisier	37	53	48	39	11	21	66	89
Moyenne générale		29	43	904	494	3	4	86	94

* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

** se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **pommes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)