



mise à jour : 07/04/2026

**Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO<sub>3</sub>/ha)  
avec précédent CIPAN (culture intermédiaire piège à nitrate)**

Régions	Apport d'engrais de ferme en été	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	Min		Max	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	Aucun	25	56	18	5	6	19	104	155
	Fumier, compost	20	53*	6	1*	7	53	30	53
	Fientes, lisier	42	62*	6	2*	22	52	61	72
Famenne - Ardenne - Jurassique	Aucun	19	28	17	13	5	12	37	42
	Fumier, compost	50*	/	4*	0*	30	0	79	0
	Fientes, lisier	24*	/	1*	0*	24	0	24	0
Limoneuse sèche	Aucun	23	37*	13	3*	10	21	100	68
	Fumier, compost	32	39	8	5	12	14	56	77
	Fientes, lisier	16*	34*	1*	1*	16	34	16	34
Toutes les régions agricoles	Aucun	22	36	48	21	5	12	104	155
	Fumier, compost	32	42	18	6	7	14	79	77
	Fientes, lisier	36	53*	8	3*	16	34	61	72
<b>Moyenne générale</b>		<b>26</b>	<b>39</b>	<b>74</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>104</b>	<b>155</b>

\* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

\*\* se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **potatoes de terre**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)