



mise à jour : 07/04/2026

Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha) avec précédent sol nu

Régions	Précédent	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	<i>Min</i>		<i>Max</i>	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	29	53	9	3*	10	17	63	91
Famenne - Ardenne - Jurassique	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	32	21	15	2*	8	17	120	25
Limoneuse humide	betterave	9	13	4*	4*	8	10	11	15
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	24	61	16	1*	12	61	68	61
Limoneuse sèche	betterave	49	56	4*	3*	12	17	86	81
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	37	63	20	15	6	7	120	170
Toutes les régions agricoles	betterave	29	31	8	7	8	10	86	81
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	31	57	60	21	6	7	120	170
Moyenne générale		31	51	68	28	6	7	120	170

* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

** se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **potatoes**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)