



mise à jour : 17/04/2026

Reliquats azotés en sortie d'hiver (kgN-NO₃/ha) avec précédent sol nu

Régions	Précédent	Reliquats moyens		Nombre d'analyses*		Reliquats min & max			
		0-60 cm**	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm	<i>Min</i>		<i>Max</i>	
						0-60 cm	0-90 cm	0-60 cm	0-90 cm
Condroz	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	29	53	9	3*	10	17	63	91
Famenne - Ardenne - Jurassique	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	32	21	15	2*	8	17	120	25
Limoneuse humide	betterave	9	13	4*	4*	8	10	11	15
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	24	61	16	1*	12	61	68	61
Limoneuse sèche	betterave	42	48	5	4*	12	17	86	81
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	36	54	54	48	5	6	153	170
Toutes les régions agricoles	betterave	28	30	9	8	8	10	86	81
	céréales, colza, lin, maïs, pdt, légumineuses et légumes	32	53	94	54	5	6	153	170
Moyenne générale		32	50	103	62	5	6	153	170

* Si le nombre d'analyses est inférieur à 5, référez-vous à une autre région ou à la moyenne générale

** se référer aux reliquats 0-60 en cultures de **potatoes**, de **légumes** et de **maïs** (résultats de prélèvements effectués avant le 1er avril)